

## KULLANMA TALİMATI

### DEXTROCİN %2 merhem

#### Haricen kullanılır.

- **Etkin madde:** %2 a/a mupirosin içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Polietilen glikol.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **DEXTROCİN nedir ve ne için kullanılır?**
2. **DEXTROCİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **DEXTROCİN nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **DEXTROCİN'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. DEXTROCİN nedir ve ne için kullanılır?**

DEXTROCİN, beyaz renkli bir merhemdir, etkin madde olarak %2 a/a oranında mupirosin içeren 15 g'lık tüp halinde bulunmaktadır. DEXTROCİN aynı zamanda aktif olmayan polietilen glikol içerir.

DEXTROCİN sadece cilt üzerinde kullanılan bir antibiyotiktir ve bakteriyel cilt enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılır.

#### **2. DEXTROCİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**DEXTROCİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- DEXTROCİN'i kullanırken bir alerjik reaksiyon gelişirse (döküntü, bölgesel ağrı veya şişme) ilacı kullanmayı kesiniz ve doktorunuza söyleyiniz.
- Mupirosin veya polietilen glikole karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

## **DEXTROCİN'i ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- Eęer daha önceden DEXTROCİN'in içindeki maddelerden herhangi birini içeren başka bir merheme karşı alerjik reaksiyon (döküntü gibi) gösterdiyseniz, DEXTROCİN kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.
- Polietilen glikol içeren dięer merhemlerde olduęu gibi, DEXTROCİN'i de, özellikle bir böbrek hastalığınız varsa, hasarlı veya çatlamıř geniş alanlara uygulamayınız. Özellikle orta veya řiddetli böbrek yetmezlięi hastalarında kullanılmamalıdır.

DEXTROCİN'i göz veya burun mukozasına temas ettirmeyiniz. Eęer kazara gözünüze kaçıysa, gözünüzü bol suyla iyice yıkayınız.

Eęer merhem herhangi bir rahatsızlık hissine yol açarsa, kullanmayı kesiniz, etkilenen alanı suyla iyice yıkayınız ve doktorunuzla görüşünüz. Doktorunuza merhemin tüpünü gösteriniz.

Uzun süreli veya belirgin ishal görülürse ya da karın krampları yaşanırsa uygulamayı kesiniz ve doktorunuzla konuşunuz.

Dięer bakteri karşıtı (antibakteriyel) ürünlerde de olduęu gibi uzun süre kullanım mupirosine duyarlı olmayan organizmaların aşırı gelişimine neden olabilir.

Böbrek hastalarında DEXTROCİN gözde, burun içinde, kanül (içi boş tüp) ile birlikte veya toplardamar kanülünün uygulandıęı bölgelerde kullanımı uygun deęildir.

*Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.*

### **DEXTROCİN'in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

Geçerli deęildir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Eęer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz size söylemedike hamileyken DEXTROCİN'i kullanmayınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Eęer bebeęinizi emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. DEXTROCİN'i meme başına sürüyorsanız, bebeęinizi emzirmeden önce tam olarak temizleyiniz.

### **Ara ve makine kullanımı**

Bu ila ara veya makine kullanma yeteęinizi etkilemez.

### **DEXTROCİN'in içerięinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

DEXTROCİN polietilen glikol içermektedir. Bu nedenle orta řiddette veya ağır böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuza söyleyiniz.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

DEXTROCİN diğer krem veya merhemlerle karıştırılmamalıdır. Bunlar DEXTROCİN' in işleyişini engelleyebilirler.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. DEXTROCİN nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:**

DEXTROCİN genellikle 10 gün boyunca, günde iki ila üç kez sürülür. Doktorunuz ilacı ne kadar sıklıkla sürmeniz gerektiğine karar verecektir.

DEXTROCİN'i doktorunuzun size tavsiye ettiği süre zarfında kullanınız. Eğer 7 günde bir iyileşme görmezseniz, doktorunuza danışınız.

Doktorunuz size aksini söylemedikçe 10 günden daha uzun bir süre tedaviye devam etmeyiniz.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

Az miktarda DEXTROCİN'i etkilenmiş bölgeye sürünüz. merhem sürüldüğü bölge bir örtü ile örtülebilir.

Merhemi kullanmadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

#### **Değişik yaş grupları:**

- **Çocuklarda kullanım:** Özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir.
- **Yaşlılarda kullanım:** Özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

#### **Özel kullanım durumları:**

**Karaciğer yetmezliği:** Özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

**Böbrek yetmezliği:** Orta veya şiddetli böbrek yetmezliğinin kanıtı olmadığı ve polietilen glikolün emilimine yol açabilen bir durum tedavi ediliyor olmadığı sürece sınırlamaya gerek yoktur. Orta veya şiddetli böbrek yetmezliği hastalarında kullanılmamalıdır.

*Eğer DEXTROCİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla DEXTROCİN kullandıysanız**

Bu ilaçla aşırı doz problemleri olası değildir.

Eğer burun merhemini kazara yutacak olursanız derhal doktorunuzla konuşunuz.

*DEXTROCİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

#### **DEXTROCİN'i kullanmayı unutursanız**

Eğer ilacınızı sürmeyi unutursanız, hatırlar hatırlamaz sürünüz. Daha önceki gibi uygulamaya devam ediniz.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

## **DEXTROCİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi DEXTROCİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa DEXTROCİN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.**

#### **Aşırı duyarlılık reaksiyonları**

- Kabarmış ve kaşıntılı genel döküntü
- Bazen yüzde ve ağızda nefes almayı zorlaştıracak şişlik
- Kolaps (kan basıncının düşmesi ile kalp kaslarının kasılması ve kalp atış sayısının artması) veya bilinç kaybı

Bunlar DEXTROCİN'in çok seyrek görülen ancak ciddi yan etkileridir.

Çok seyrek olarak mupirosin kullanımı kalın bağırsakta iltihaba, kanlı ve mukuslu ishale, karın ağrısına ve ateşe sebep olabilir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DEXTROCİN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir:

Çok yaygın: 10 kişide 1'den fazla

Yaygın: 10 kişide 1'den az, 100 kişide 1'den fazla

Yaygın olmayan: 100 kişide 1'den az, 1.000 kişide 1'den fazla

Seyrek: 1.000 kişide 1'den az, 10.000 kişide 1'den fazla

Çok seyrek: 10.000 kişide 1'den az

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

#### **Yaygın yan etkiler:**

- Uygulama yerinde bölgesel yanma

#### **Yaygın olmayan yan etkiler:**

- Uygulama yerinde bölgesel kaşıntı, kaşıntı, ciltte kızarıklık, batma ve kuruma
- Merhem bazına veya mupirosine karşı deri hassasiyeti belirtileri

#### **Çok seyrek görülen yan etkiler:**

- El, avuç içi, ayak tabanları da dahil genel döküntü
- Kurdeşen
- Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem) gibi alerjik reaksiyonlar

Bu yan etkiler yaygın olmayan, seyrek görülen ancak ciddi yan etkilerdir.

Eğer bu yan etkilerden birini fark ederseniz veya DEXTROCİN kullanırken başka problemlerle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

#### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5. DEXTROCİN’in saklanması**

*DEXTROCİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C altında oda sıcaklığında saklayınız.*

#### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEXTROCİN’i kullanmayınız.*

“Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.”

#### ***Ruhsat sahibi:***

Humanis Sağlık A.Ş  
Maslak/Sarıyer/İstanbul

#### ***Üretim yeri:***

Humanis Sağlık A.Ş  
Kapaklı/Tekirdağ

*Bu kullanma talimatı 08.03.2023 tarihinde onaylanmıştır.*